

Pojava u
dojenačkoj
dobi kod:

SMA TIP 1



SPEKTAR

TEGOBA¹⁻³

PRATEĆE BOLESTI

I KOMPLIKACIJE⁴⁻⁶

SLABOST U
NADLAKTICAMA
I BEDRIMA



POREMEĆAJ DISANJA I
POTEŠKOĆE PRI HRANJENJU
– opasnost od udisanja hrane



FASCIKULACIJA
(TRZANJE) JEZIKA



SLABO DRŽANJE
GLAVE



Simptomi se
javljaju između
1. I 6. MJESECA



KRATAK OČEKIVANI
ŽIVOTNI VIJEK
(obično manje od 2 godine)



ZATAJENJE disanja,
posebno kod SMA tip 1 i tip 2⁴



Kasnija
pojava:

SMA TIP 2

SAMOSTALNO sjedi, ali
NE MOŽE HODATI

**TRZANJE NADLAKTICA
i BEDARA**

SLABOST ČELJUSTI

**SPEKTAR
TEGOBA¹⁻³**

Simptomi se
**JAVLJAJU između
7. i 18. MJESECA**

**SKRAĆENI OČEKIVANI
ŽIVOTNI VIJEK**

**PRATEĆE BOLESTI
i KOMPLIKACIJE⁴⁻⁶**

ČESTE PROBAVNE TEGOBE,
npr. zatvor i vraćanje želučane kiseline⁶

Kasnija
pojava:

SMA TIP 3

OPASNOST od PRETILOSTI i OSTEOPOROZE

SAMOSTALNO HODA,
ali s vremenom **MOŽE**
IZGUBITI tu sposobnost

Simptomi se
javljaju **NAKON**
18. MJESECA

SLABOST gornjega
dijela nogu koja
raste s vremenom

NORMALAN OČEKIVANI
ŽIVOTNI VIJEK

SPEKTAR

TEGOBA¹⁻³

PRATEĆE BOLESTI

I KOMPLIKACIJE⁴⁻⁶


Kod SMA tip 2 i 3 česte su ortopedske **KOMPLIKACIJE**,
posebno **SKOLIOZA** (nenormalna zakrivljenost kralježnice),
PRIJELOMI i **DISLOKACIJA KUKA**^{4,5}

Kod SMA, nakon početnog perioda u kojem se usvajaju motoričke vještine, slijedi period opadanja i progresija bolesti (i gubitak motoričkih sposobnosti), što najbrže nastupa u ranim fazama¹

PRIRODNO NAPREDOVANJE BOLESTI KOD SMA UKLJUČUJE IREVERZIBILNI GUBITAK MOTORIČKE FUNKCIJE*1

NAPREDOVANJE BOLESTI

Ilustracija raspona motoričkih funkcija u svim spektrima SMA*1



* Približan grafički prikaz evolucije pacijenta sa SMA, podijeljenih u podskupine, nastao kao rezultat istraživanja prirodnog tijeka bolesti.

1. Swoboda KJ, et al. J Child Neurol. 2007;22:957-66.